

## Gebrauchsinformation

# Bluevac<sup>®</sup>-8



Injektionssuspension für Schafe und Rinder  
Inaktivierter Impfstoff gegen die Blauzungkrankheit

**Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und des Herstellers**

Pharmazeutischer Unternehmer:  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim

Hersteller:  
CZ Veterinaria, S.A.  
Postfach 16  
Porrino (Pontevedra)  
Spanien

**Bezeichnung des Tierarzneimittels Bluevac<sup>®</sup>-8**

Injektionssuspension  
für Schafe und Rinder

**Arzneilich wirksamer Bestandteil und sonstige Bestandteile**

2 ml des Impfstoffes enthalten:  
Inaktiviertes Blauzungenvirus,  
Serotyp 8  $\geq 32 E^1$  anti-VP7  
Thiomersal 0,2 mg  
Aluminium (als Hydroxid)  
und Quil A q.s. 2 ml

<sup>1</sup> Elisasinheit: Inverse höchste Serumverdünnung mit positiver anti-VP7 Antwort.

**Anwendungsgebiete**

Aktive Immunisierung von Schafen und Rindern zur Verhinderung einer durch den Serotyp 8 des Blauzungenvirus hervorgerufenen Virämie.

Beginn der Immunität: 15 Tage nach der Impfung.

**Gegenanzeigen**

Keine bekannt.

**Nebenwirkungen**

Wie bei jedem immunologischen Tierarzneimittel können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesem Fall soll unverzüglich eine adäquate antihistaminische Therapie erfolgen.

Falls Sie Nebenwirkungen (insbesondere solche, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind) bei Ihrem Tier/Ihren Tieren beobachten, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

**Zieltierarten**

Schafe und Rinder

**Dosierung für jede Zieltierart, Art der Anwendung**

Impfdosis:

- Schafe: 2 ml
- Rinder: 4 ml

Direkt vor der Anwendung kräftig schütteln.

Zur subkutanen Anwendung, vorzugsweise am Hals, hinter dem Ohr oder im Bereich der Schulter.

Impfschema:

Schafe: eine Impfdosis ab einem Alter von 3 Monaten. Eine Boosterimpfung im Rahmen der Grundimmunisierung ist nicht zwingend erforderlich.

Rinder: Ab einem Alter von 3 Monaten sollen 2 Impfdosen im Abstand von 3 bis 4 Wochen verabreicht werden.

**Wiederholungsimpfung:**

Eine Impfdosis jeweils im Frühjahr (vor der Periode des hohen Infektionsrisikos).

**Wartezeit**

Null Tage.

**Besondere Lagerungshinweise**

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Kühl lagern und transportieren (2°C – 8°C). Vor Licht schützen.

Nicht eingefrieren.

Sofort nach Anbruch verwenden.

**Besondere Hinweise**

Übliche hygienische Maßnahmen anwenden.

Nur gesunde und von Parasiten freie Tiere impfen.

Der Impfstoff darf nur im Rahmen der Ausnahmegenehmigung gemäß § 17c TierSG angewendet werden.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend lokaler Regelungen unschädlich zu beseitigen.

**Genehmigungsdatum der Gebrauchsinformation**

November 2008

**Weitere Angaben**

Packung mit einer Flasche a 100 ml.

Packung mit einer Flasche a 250 ml.

Verschreibungspflichtig.

**Bluevac®** ist Produkt und eingetragenes Warenzeichen der CZ Veterinaria S.A., Spanien.