

Todesfallmeldungen von Kindern der Datenbank des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) „Verdachtsfälle von Impfkomplicationen“

Anmerkung: Grundsätzlich geht man davon aus, dass nur etwa 5 – maximal 10 % überhaupt gemeldet wird!

a) Zeitabstände Impfung - Todesfall

2008: 18 Todesfälle gemeldet – auswertbar **14** (weil Daten komplett)

Bis 7 Tage nach der Impfung	7 – 14 Tage	länger als 14 Tage
11 = 78 %	1 (14)	2 (15,16)

Detailliert die ersten 7 Tage: 0Tage/2 1 Tag /1 2 Tage/2 3 Tage/3 4T/- 5T/2 6T/- 7/1

2007: 20 Todesfälle gemeldet – auswertbar **15**

Bis 7 Tage nach der Impfung	7 – 14 Tage	länger als 14 Tage
13 = 86 %	1	1

Detailliert 0T/1 1T/2 2T/6 3T/2 4T/2 5T/- 6T/- 7/-

2006: 23 Todesfälle gemeldet – auswertbar **19**

Bis 7 Tage nach der Impfung	7 – 14 Tage	länger als 14 Tage
16 = 84 %	2	1

Detailliert: 0 T/3 1 T/1 2 T/2 3T/2 4T/4 5T/1 6T/1 7/2

Jahre 2003 bis 2008

Jahr	Meldungen	unbekannt	auswertbar	Bis 7 Tage nach der Impfung
2008	18	4	14	11 = 78 %
2007	20	5	15	13 = 86 %
2006	23	4	19	16 = 84 %
2005	21	5	16	13 = 81 %
2004	31	2	29	19 = 65 %
2003	24	2	22	21 = 95 %

Durchschnittswert 2003 bis 2008:

81,5 %

Ergebnis:

80% (4 von 5 Kindern) sterben innerhalb 7 Tage nach der Impfung

b) Impfstoffe (Hersteller)

In der gesamten Datei (2001 – 2009) sind Todesfälle von Kindern gemeldet: 149

Hauptbeteiligt waren:

	Impfstoffname	Hersteller	Anmerkung
72 x	Infanrix hexa 6-fach-Impfstoff	GlaxoSmithKline (GSK)	Wird seit 2006 vermehrt mit Prevenar verimpft also 6-fach + 1-fach
8 x	Infanrix-IP+Hib 5-fach-Impfstoff	GlaxoSmithKline	wurde ab etwa 2003 weniger angewandt, da dann 6-fach-Impfung Infanrix hexa nachfolgte
33 x	Hexavac 6-fach-Impfstoff	Sanofi Pasteur	Zulassung im Sept. 04 entzogen, so dass danach kaum noch angewendet wurde
41 x	Prevenar 1-fach-Impfstoff gegen Pneumokokken	Wyeth	allein verabreicht bei 10 Fällen, ansonsten 30 x mit einem 6-fach-Impfstoff (hauptsächlich Infanrix hexa) und 1x zusammen mit FSME-Impfstoff)

Auswertung der Jahre 2003 -2008

2008: 18 Todesfälle (Kinder) gemeldet

Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff)	0	wird fast nur noch mit Prevenar zusammen verimpft
Infanrix hexa + Prevenar	10	
Infanrix hexa + Neisvac-C (Baxter)	1	

Je eine Meldung:

Rotarix (GSK, gegen Rotaviren)

Prevenar (Wyeth, gegen Pneumokokken)

Gardasil (Sanofi Pasteur, gegen Gebärmutterhalskrebs)

Hexavac (6-fach) + Engerix-B (GSK, gegen Hepatitis B (sonderbar, da in Hexavac auch Hep-B!))

Neisvac C (Baxter, gegen Meningokokken))

Mutagrapp (Sanofi Pasteur, früher Aventis, gegen Grippe)

Priorix (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln)

2007: 20 Todesfälle (Kinder) gemeldet

Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff)	3
Infanrix hexa mit Prevenar	9
Infanrix hexa mit MMR Triplovac (Sanofi Pasteur)	1
Priorix (GSK, 3-fach, Masern, Mumps, Röteln)	2
Priorix Tetra (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken)	2
Gardasil (Sanofi Pasteur gegen Gebärmutterhalskrebs)	1
Encepur (Novartis, gegen FSME) + Pneumovax (Aventis, gegen Pneumokokken)	1
Engerix (GSK, gegen HepB) + Infanrix-IPV+Hib (5-fach)	1

2006: 23 Todesfälle (Kinder) gemeldet

Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff)	11
Infanrix hexa + Prevenar	4
Infanrix hexa + Priorix (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln)	1
Infanrix-IPV+Hib (GSK, 5-fach)	2
Hexavac (Sanofi Pasteur, 6-fach)	2
Prevenar (Wyeth, gegen Pneumokokken)	1
Priorix Tetra (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken)	1
Begrivac 06/07 (Chiron Behring, jetzt Novatis, gegen Grippe)	1

2005: 21 Todesfälle (Kinder) gemeldet

Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff)	8
Infanrix hexa + Prevenar	2
Infanrix hexa + Pneumokokken-Konjugatimpfstoff	1
Infanrix-IPV+Hib (GSK, 5-fach)	1
Hexavac (Sanofi Pasteur, 6-fach)	4
Hexavac + Prevenar	1
Priorix (GSK, 3-fach, Masern, Mumps, Röteln)	1
Meningitec (Wyeth, gegen Meningokokken)	1
Influsplit (GSK, gegen Grippe)	1
FSME-Immun (Baxter) + Twinrix (GSK, 2-fach HepA+B)	1

2004: 31 Todesfälle (Kinder) gemeldet

Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff)	9
Infanrix hexa + Prevenar	2
Infanrix hexa + Priorix (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln)	1
Infanrix-IPV+Hib (GSK, 5-fach)	1
Hexavac (Sanofi Pasteur, 6-fach)	9
Prevenar (Wyeth, gegen Pneumokokken)	6
Pneumovac (Aventis P., gegen Pneumokokken)	1
Varilrix (GSK, gegen Pneumokokken)	1
DT (Behring + Polio oral/Virelon !!! Schluckimpfung)	1
Influsplit (GSK, gegen Grippe)	1

2003: 24 Todesfälle (Kinder) gemeldet

Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff)	9
Infanrix hexa + Prevenar	1
Infanrix hexa + Meningitec (Wyeth, gegen Meningokokken)	1
Infanrix-IPV+Hib (GSK, 5-fach) + Engerix (GSK, gegen HepB)	1
Hexavac (Sanofi Pasteur, 6-fach)	10
Prevenar (Wyeth, gegen Pneumokokken)	1
M-MVax (Chiron Behring, gegen Masern, Mumps)	1

Ergebnis:

Von den insgesamt 149 Todesfällen war bei

75 %

ein 6-fach-Impfstoff beteiligt!!

Aber:

11% (21 Meldungen) - etwa jedes 10. Kind - starben nach einem Mono-Impfstoff (Spitzenreiter Pneumokokken-Impfung 10 Meldungen)!

Auswertung Todesfälle der Datenbank des Paul-Ehrlich-Instituts „Verdachtsfälle von Impfkomplicationen“ der Jahre 2003 bis 2008
Eingabe Todesfall, Kategorie Alter 0 bis 23 Monate (dies war auch der Alterssprengel für die TOKEN-Studie)

	L e b e n s a l t e r b e i T o d i n M o n a t e												
Meldungen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2003	24	2	7	4	4	3	0	1	0	0	0	1	
2004	29	2	8	9	2	2	1	1	0	0	0	0	
2005	19	1	7	4	1	1	1	1	0	1	0	0	
2006	23	5	3	2	2	0	1	1	0	0	1	3	
2007	15	4	3	1	0	1	1	0	0	0	1	0	
2008	15	1	6	0	0	1	0	1	0	0	2	1	
insgesamt	125	15	34	20	9	8	4	5	0	1	4	5	

	L e b e n s a l t e r b e i T o d i n M o n a t e												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Keine Altersangabe
2003	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2004	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	
2005	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
2006	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
2007	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
insgesamt	5	1	3	2	1	1	2	0	3	0	0	0	2

Interpretation/Interpretationsmöglichkeiten:

Der Modus liegt eindeutig beim Sterbealter **2 – 4 Monate!!!** - insg. 69 Meldungen!!!

15 Kinder haben vermutlich die erste Impfung schon nicht überlebt. Aber manche Kinder bekommen die erste Impfung erst im 3. oder 4. Monat, so dass diese Zahl sicher noch höher ist. Es wäre interessant, wenn dies aus der Datei hervorgehen würde, um welche Impffolge es sich handelt - war es die erste, zweite, dritte oder vierte 6-fach-Impfung? Laut Plan der Stiko sollten diese verabreicht werden im 2./3./4. und 11. Monat)

Die Zahlen 5. und 6. Lebensmonat sind sicher deshalb noch leicht erhöht, weil Impfungen wegen eines Infektes oft verschoben werden müssen.

Leichter Anstieg 11. bis etwa 15. Monat. Hier gibt es die letzte 7-fach-Packung und der Beginn der MMRV-Impfung (Masern, Mumps, Röteln, Windpocken).

Die Kinder sterben schön nach STIKO-Plan. Spiegelt die TOKEN-Studie auch dieses Drama? Gibt es in den anderen Monaten, in denen nicht so viel geimpft wird, auch so viele Todesfälle? Ich vermute nicht.

Und warum gibt es seit Februar keine Aktualisierung der Datenbank? Hat man das Drama erkannt und hält die Zahlen zurück?

Immer daran denken: Es werden nur 5 – max. 10 % gemeldet.