

Hersteller: [Berna Biotech AG, Schweiz](#)

Infectovac® Flu Fertigspritze mit Suspension zur intramuskulären oder subkutanen Injektion

Rezeptpflichtig

Zusammensetzung:

1 Impfdosis (0,5 ml) enth.: Oberflächenantigene v. inaktivierten Influenzaviren entspr. WHO-Empf. je 15 µg Hämagglutinin.

Weit. Bestandteile: Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat 2H₂O, Kaliumdihydrogenphosphat, Lecithin, Wasser f. Inj.-zwecke, Spuren v. Hühnerproteinen, Polymyxin B, Hühnereiproteine, Neomycin.

1 Fertigspr. 0,5 ml mit Kanüle 22,72 PZN 6866309

10 Fertigspr. 0,5 ml mit Kanüle 129,35 PZN 6866427

Anwendung: Vorbeug. d. Influenza b. Erw. u. Kdr. >6. Lebensmon.

Gegenanzeigen: I 7 a (akut Erkrankte). Hühnereiweißallergie. I.v. Anw.

Schwangerschaft: Strenge Ind.-Stellung Gr 4 (Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch erbrachte keine Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen).

Nebenwirkungen: I 7. (Lokalreaktionen (Rötungen, Schwellungen, Schmerzen))

Lokalreaktionen:

Ekchymose, Verhärtung. System. Reakt.: Unwohls., Frösteln, Müdigk., Schwitzen, Myalgie, Arthralgie. Gelegentl.: General. Hautausschläge m. Juckreiz, Urtikaria u. nichtspezif. Ausschlag. Selten: Neuralgie, Parästhesien, Krampfanf., vorübergeh. Thrombozytopenie, Schock. Sehr selten: Vaskulitis m. Nierenbeteil., Enzephalomyelitis, Neuritis, Guillain-Barré-Syndrom.

Wechselwirkungen:

Gleichz. Applikation and. Impfstoffe an unterschiedl. Körperstellen mögl., unerwünschte Reakt. können verstärkt sein. Vermind. Immunantwort b. immunsuppressiver Behandl. Falsch pos. Resultate b. serolog. Tests (ELISA).

Hinweis: Nicht mit and. Impfstoffen mischen.

Dosierung:

Erw. u. Kdr. ab 36 Mon.: 0,5 ml; Kdr. 6-35 Mon.: 0,25 ml, bisher ungeimpfte Kdr. sollten nach mind. 4 Wo. eine zweite Impfdos. bekommen.

Lagerungshinweis!

Quelle: <http://www.rote-liste.de>

Wiedergabe ohne Gewähr!