

Todesfallmeldungen von Kindern der Datenbank des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) „Verdachtsfälle von Impfkomplicationen“

Anmerkung: Grundsätzlich geht man davon aus, dass nur etwa 5 – maximal 10 % überhaupt gemeldet wird!

a) Zeitabstände Impfung - Todesfall

2008: 18 Todesfälle gemeldet – auswertbar **14** (weil Daten komplett)

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| Bis 7 Tage nach der Impfung | 7 – 14 Tage | länger als 14 Tage |
| 11 = 78 % | 1 (14) | 2 (15,16) |

Detailliert die ersten 7 Tage: 0Tage/2 1 Tag /1 2 Tage/2 3 Tage/3 4T/- 5T/2 6T/- 7/1

2007: 20 Todesfälle gemeldet – auswertbar **15**

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| Bis 7 Tage nach der Impfung | 7 – 14 Tage | länger als 14 Tage |
| 13 = 86 % | 1 | 1 |

Detailliert 0T/1 1T/2 2T/6 3T/2 4T/2 5T/- 6T/- 7/-

2006: 23 Todesfälle gemeldet – auswertbar **19**

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| Bis 7 Tage nach der Impfung | 7 – 14 Tage | länger als 14 Tage |
| 16 = 84 % | 2 | 1 |

Detailliert: 0 T/3 1 T/1 2 T/2 3T/2 4T/4 5T/1 6T/1 7/2

Jahre 2003 bis 2008

| Jahr | Meldungen | unbekannt | auswertbar | Bis 7 Tage nach der Impfung |
|------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
| 2008 | 18 | 4 | 14 | 11 = 78 % |
| 2007 | 20 | 5 | 15 | 13 = 86 % |
| 2006 | 23 | 4 | 19 | 16 = 84 % |
| 2005 | 21 | 5 | 16 | 13 = 81 % |
| 2004 | 31 | 2 | 29 | 19 = 65 % |
| 2003 | 24 | 2 | 22 | 21 = 95 % |

Durchschnittswert 2003 bis 2008:

81,5 %

Ergebnis:

80% (4 von 5 Kindern) sterben innerhalb 7 Tage nach der Impfung

b) Impfstoffe (Hersteller)

In der gesamten Datei (2001 – 2009) sind Todesfälle von Kindern gemeldet: 149

Hauptbeteiligt waren:

| | Impfstoffname | Hersteller | Anmerkung |
|------|---|--------------------------|---|
| 72 x | Infanrix hexa 6-fach-Impfstoff | GlaxoSmithKline (GSK) | Wird seit 2006 vermehrt mit Prevenar verimpft also 6-fach + 1-fach |
| 8 x | Infanrix-IP+Hib 5-fach-Impfstoff | GlaxoSmithKline | wurde ab etwa 2003 weniger angewandt, da dann 6-fach-Impfung Infanrix hexa nachfolgte |
| 33 x | Hexavac 6-fach-Impfstoff | Sanofi Pasteur | Zulassung im Sept. 04 entzogen, so dass danach kaum noch angewendet wurde |
| 41 x | Prevenar 1-fach-Impfstoff gegen Pneumokokken | Wyeth | allein verabreicht bei 10 Fällen, ansonsten 30 x mit einem 6-fach-Impfstoff (hauptsächlich Infanrix hexa) und 1x zusammen mit FSME-Impfstoff) |

Auswertung der Jahre 2003 -2008

2008: 18 Todesfälle (Kinder) gemeldet

| | | |
|--|----|---|
| Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff) | 0 | wird fast nur noch mit Prevenar zusammen verimpft |
| Infanrix hexa + Prevenar | 10 | |
| Infanrix hexa + Neisvac-C (Baxter) | 1 | |

Je eine Meldung:

Rotarix (GSK, gegen Rotaviren)

Prevenar (Wyeth, gegen Pneumokokken)

Gardasil (Sanofi Pasteur, gegen Gebärmutterhalskrebs)

Hexavac (6-fach) + Engerix-B (GSK, gegen Hepatitis B (sonderbar, da in Hexavac auch Hep-B!))

Neisvac C (Baxter, gegen Meningokokken))

Mutagrripp (Sanofi Pasteur, früher Aventis, gegen Grippe)

Priorix (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln)

2007: 20 Todesfälle (Kinder) gemeldet

| | |
|---|---|
| Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff) | 3 |
| Infanrix hexa mit Prevenar | 9 |
| Infanrix hexa mit MMR Triplovac (Sanofi Pasteur) | 1 |
| Priorix (GSK, 3-fach, Masern, Mumps, Röteln) | 2 |
| Priorix Tetra (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken) | 2 |
| Gardasil (Safoni Pasteur gegen Gebärmutterhalskrebs) | 1 |
| Encepur (Novatis, gegen FSME) + Pneumovax (Aventis, gegen Pneumokokken) | 1 |
| Engerix (GSK, gegen HepB) + Infanrix-IPV+Hib (5-fach) | 1 |

2006: 23 Todesfälle (Kinder) gemeldet

| | |
|--|----|
| Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff) | 11 |
| Infanrix hexa + Prevenar | 4 |
| Infanrix hexa + Priorix (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln) | 1 |
| Infanrix-IPV+Hib (GSK, 5-fach) | 2 |
| Hexavac (Sanofi Pasteur, 6-fach) | 2 |
| Prevenar (Wyeth, gegen Pneumokokken) | 1 |
| Priorix Tetra (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken) | 1 |
| Begrivac 06/07 (Chiron Behring, jetzt Novatis, gegen Grippe) | 1 |

2005: 21 Todesfälle (Kinder) gemeldet

| | |
|--|---|
| Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff) | 8 |
| Infanrix hexa + Prevenar | 2 |
| Infanrix hexa + Pneumokokken-Konjugatimpfstoff | 1 |
| Infanrix-IPV+Hib (GSK, 5-fach) | 1 |
| Hexavac (Sanofi Pasteur, 6-fach) | 4 |
| Hexavac + Prevenar | 1 |
| Priorix (GSK, 3-fach, Masern, Mumps, Röteln) | 1 |
| Meningitec (Wyeth, gegen Meningokokken) | 1 |
| Influsplit (GSK, gegen Grippe) | 1 |
| FSME-Immun (Baxter) + Twinrix (GSK, 2-fach HepA+B) | 1 |

2004: 31 Todesfälle (Kinder) gemeldet

| | |
|--|---|
| Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff) | 9 |
| Infanrix hexa + Prevenar | 2 |
| Infanrix hexa + Priorix (GSK, gegen Masern, Mumps, Röteln) | 1 |
| Infanrix-IPV+Hib (GSK, 5-fach) | 1 |
| Hexavac (Sanofi Pasteur, 6-fach) | 8 |
| Prevenar (Wyeth, gegen Pneumokokken) | 6 |
| Pneumovac (Aventis P., gegen Pneumokokken) | 1 |
| Varilrix (GSK, gegen Pneumokokken) | 1 |
| DT (Behring + Polio oral/Virelon !!! Schluckimpfung) | 1 |
| Influsplit (GSK, gegen Grippe) | 1 |

2003: 24 Todesfälle (Kinder) gemeldet

| | |
|--|----|
| Infanrix hexa allein (GSK, 6-fach-Impfstoff) | 9 |
| Infanrix hexa + Prevenar | 1 |
| Infanrix hexa + Meningitec (Wyeth, gegen Meningokokken) | 1 |
| Infanrix-IPV+Hib (GSK, 5-fach) + Engerix (GSK, gegen HepB) | 1 |
| Hexavac (Sanofi Pasteur, 6-fach) | 10 |
| Prevenar (Wyeth, gegen Pneumokokken) | 1 |
| M-MVax (Chiron Behring, gegen Masern, Mumps) | 1 |

Ergebnis:

Von den insgesamt 149 Todesfällen war bei

75 %

ein 6-fach-Impfstoff beteiligt!!

Aber:

11% (21 Meldungen) - etwa jedes 10. Kind - starben nach einem Mono-Impfstoff (Spitzenreiter Pneumokokken-Impfung 10 Meldungen)! Wobei ich vermute, dass diese Kinder davor auch einige Impfungen bekamen, vermutlich auch Infanrix hexa, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Arzt nur Prevenar verimpft. Vielleicht war Prevenar zwar die letzte Impfung, aber es geht aus der Datenbank nicht hervor, welche Impfungen das Kind vorher bekam.

Anfragen: marionka@hotmail.de

Auswertung Todesfälle der Datenbank des Paul-Ehrlich-Instituts „Verdachtsfälle von Impfkomplicationen“ der Jahre 2003 bis 2008
Eingabe Todesfall, Kategorie Alter 0 bis 23 Monate (dies war auch der Alterssprengel für die TOKEN-Studie)

| | L e b e n s a l t e r b e i T o d i n M o n a t e | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|---|--|
| Meldungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2003 | 24 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2004 | 29 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 19 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 | 23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2007 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| insgesamt | 125 | 15 | 34 | 20 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | |

| | L e b e n s a l t e r b e i T o d i n M o n a t e | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Keine Altersangabe |
| 2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| insgesamt | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Interpretation/Interpretationsmöglichkeiten:

Der Modus liegt eindeutig beim Sterbealter **2 – 4 Monate!!!** - insg. 69 Meldungen!!!

15 Kinder haben vermutlich die erste Impfung schon nicht überlebt. Aber manche Kinder bekommen die erste Impfung erst im 3. oder 4. Monat, so dass diese Zahl sicher noch höher ist. Es wäre interessant, wenn dies aus der Datei hervorgehen würde, um welche Impffolge es sich handelt - war es die erste, zweite, dritte oder vierte 6-fach-Impfung? Laut Plan der Stiko sollten diese verabreicht werden im 2./3./4. und 11. Monat)

Die Zahlen 5. und 6. Lebensmonat sind sicher deshalb noch leicht erhöht, weil manche Eltern später mit den Impfungen anfangen wollen oder Impfungen wegen eines Infektes verschoben werden müssen.

Leichter Anstieg 11. bis etwa 15. Monat. Hier gibt es die letzte 7-fach-Packung und der Beginn der MMRV-Impfung (Masern, Mumps, Röteln, Windpocken).

Man könnte meinen, die Kinder sterben schön nach STIKO-Plan. Daraus ergibt sich die Frage: Gibt es in den anderen Monaten, in denen nicht so viel geimpft wird, auch so viele Todesfälle? Ich vermute nicht. Aber so etwas wird ja leider nie untersucht.

Immer daran denken: Es werden nur etwa 5 % gemeldet.